


Gebrauchsanweisung EURneffy 2 mg Nasenspray, Lösung in Einzeldosisbehältnis Adrenalin



Machen Sie sich vor der Anwendung des Nasensprays vollständig mit EURneffy vertraut, einschließlich wie und wann Sie es anwenden müssen.

EURneffy 2 mg Nasenspray:




Dieses Nasenspray enthält nur eine Dosis:

- Nicht vorab am Kolben ziehen oder drücken.
- Nutzen Sie das Nasenspray direkt, ohne es vorher zu testen oder einen Vorab-Sprühstoß abzugeben.

Diese Gebrauchsanweisung wurde als risikominimierende Maßnahme beauftragt und mit dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) abgestimmt. Es soll sicherstellen, dass Angehörige der Heilberufe und Patienten die besonderen Sicherheitsanforderungen von EURneffy Nasenspray kennen und berücksichtigen.


Version 1.0 / 01.2025

Befolgen Sie diese Anweisungen erst, wenn Sie für die Anwendung bereit sind.



A


Nehmen Sie EURneffy 2 mg Nasenspray aus der Verpackung.
Ziehen Sie die Verpackung auf, um das EURneffy 2 mg Nasenspray herauszunehmen.



B


Halten Sie das Nasenspray wie abgebildet.
Halten Sie das Nasenspray so, dass Ihr Daumen auf der Unterseite des Kolbens und je ein Finger auf beiden Seiten der Düse sitzt.

- **Nicht vorab am Kolben ziehen oder drücken, jedes Nasenspray enthält nur eine Dosis.**



C

Führen Sie die Nasensprayspitze in ein Nasenloch ein, bis Ihre Finger Ihre Nase berühren.
Halten Sie die Düse gerade in der Nase, sodass sie zur Stirn zeigt.



D

Drücken Sie den Kolben fest nach oben, bis der Kolben einrastet und die Lösung in das Nasenloch gesprüht wird.




E

Richten Sie das Nasenspray nicht auf die Innen- oder Außenwände der Nase.

+ Ziehen Sie medizinische Notfallhilfe hinzu.

Rufen Sie sofort einen Rettungswagen, um die anaphylaktische Reaktion engmaschig überwachen zu lassen, und für den Fall, dass eine weitere Behandlung erforderlich ist.

↻ Überwachen Sie die Symptome des Patienten



Wenn die Symptome nach 10 Minuten noch immer andauern, sich weiter verschlechtern, erneut auftreten, oder ein Dosierungsfehler vorliegt, verabreichen Sie eine zweite Dosis mit einem neuen EURneffy Nasenspray im selben Nasenloch wie die erste Dosis und ziehen Sie dringend medizinische Notfallhilfe hinzu.

Sie sollten sich hinlegen und die Füße hochlagern. Bei Atembeschwerden sollten Sie sich jedoch aufrecht hinsetzen. Bewusstlose Personen sollten in die stabile Seitenlage gebracht werden, um ein Erstickern zu vermeiden. Sie sollten, wenn möglich, eine andere Person bitten, bei Ihnen zu bleiben, bis medizinische Hilfe eintrifft.



eurneffy.eu
Scannen für mehr Informationen



ALK-Abelló A/S
Bøge Allé 6-8
2970 Hørsholm, Dänemark

1069278